


MICROBIOTICA

Mikrobiom Modulation – Evidenzbasiert

Innovall® SUD



Indikation	Zur diätetischen Behandlung von symptomatischer unkomplizierter Divertikelkrankheit (SUD). ¹
Zusammensetzung	Eine Kapsel enthält 24 Milliarden vermehrungsfähige Keime <i>Lactobacillus casei</i> DG® (LcDG). ¹
Empfohlene Anwendung	Die Anwendung von Innovall® SUD wird empfohlen für Erwachsene. Täglich soll 1 Kapsel an 10 aufeinanderfolgenden Tagen pro Monat mit einem Schluck Wasser eingenommen werden. ¹
Dauer der Anwendung	Innovall® SUD soll über mehrere Monate eingenommen werden. ¹



MICROBIOTICA

Mikrobiom Modulation – Evidenzbasiert

Studien

Tursi A et al., 2013²

85 % weniger Divertikulitis mit Innoval[®] SUD

- Randomisierte, Placebo-kontrollierte, doppelblinde Studie zur Wirksamkeit hinsichtlich des Erhalts der Remissionsphase mit Mesalazin und/oder *Lactobacillus casei* DG[®] bei 210 Patienten mit SUD über 12 Monate in vier Gruppen (Mesalazin 1,6 g/Tag plus Placebo, LcDG plus Placebo, LcDG plus Mesalazin oder zweifach Placebo).
Eingeschlossen wurden Patienten mit symptomatischen Episoden einer SUD nicht länger als vier Wochen vor Studienbeginn. Primäres Ziel der Studie war der Erhalt der Remission bei SUD-Patienten, sekundärer Endpunkt war die Prävention einer akuten Divertikulitis.
- Unter Placebo entwickeln 46 % ein SUD-Rezidiv. 14,5 % der Patienten bekommen unter der Monotherapie mit Innoval[®] SUD ein SUD-Rezidiv, bei Monotherapie mit Mesalazin sind es 13,7 %, bei Gabe der Kombination Mesalazin und Innoval[®] SUD bleibt die Remission bei allen Patienten (100,0 %) erhalten.
- Mit Innoval[®] SUD treten 85 % weniger Divertikulitis-Fälle im Vergleich zu Placebo auf. Bei Monotherapie mit Mesalazin und der Kombination Mesalazin und Innoval[®] SUD entwickelt sich bei keinem der Patienten eine Divertikulitis.

Quellen

1. Information für Fachkreise Innoval[®] SUD, aktueller Stand
2. Tursi A et al. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38: 741-751.